

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

アンデドラッグステロイド配合

かゆい「部位」に効く 手・指の湿疹・かぶれに
＜鎮痒消炎薬＞ **メソッド AS軟膏** 第2類医薬品

＜こんな症状に・こんな方に＞



かゆくて
つらい



割れてしみる、
ボロボロ皮がめくれる



水仕事を
よくする人に

5種の有効成分が効く



**かゆみを
すばやく止める**

- ・ジフェンヒドラミン塩酸塩
- ・クロタミトン

患部を殺菌する

- ・イソプロピルメチルフェノール

**炎症を鎮め、
赤みやブツブツを抑える**

- ・プレドニゾロン吉草酸
エステル酢酸エステル

**血行を促進し、
患部の修復を助ける**

- ・トコフェロール酢酸エステル

**アンデドラッグステロイド
(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)
基準内最大量配合***

アンデドラッグステロイドとは……
皮膚表面の患部では優れた効果を発揮し、体内では分解されて穏やかな物質になる、有効性と安全性を考えて開発されたステロイドです。

※一般用鎮痒消炎薬製造販売承認基準の最大量配合 承認基準とは、厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと

●患部に密着して守る、しみない軟膏 ●無香料、無着色、防腐剤(パラベン)無配合 ●乳幼児から大人まで使えます

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2) 目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。
- 顔面には、広範囲に使用しないでください
- 長期連続して使用しないでください (必ず裏面もお読みください)

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

かゆみ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。
<用法・用量に関連する注意>
(1) 定められた用法・用量を守ってください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。
(5) 本剤を塗擦後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

成分(1g中)		
有効成分	含 量	は た ら き
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル<アンデドラッグステロイド>	1.5mg	炎症を鎮め、赤みやブツブツを抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg	かゆみをすばやく止めます。
クロタミトン	50mg	
イソプロピルメチルフェノール	1mg	患部を殺菌します。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、患部の修復を助けます。

添加物：白色ワセリン、流動パラフィン、ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、BHT、l-メントール、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5) 使用後は必ずしっかりキャップを閉めてください。