

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ側面に記載）を過ぎた製品は服用しないこと



低気圧などで**不調**を感じる方に

第2類医薬品

漢方製剤

漢方 テイラック

販売名：テイラック

製品特徴

- 低気圧などによる複数の不調（頭痛・めまい・むくみ等）に効きます
- 漢方処方“五苓散”が、気圧変動による体内バランスの乱れに伴う症状を改善します
- 持ち運びしやすい個包装タイプです

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 1ヶ月位（急性胃腸炎、二日酔い）に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたり）に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（裏面につづく）

効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しびり腹^注）のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔^注）しびり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものである

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1 回量	服用回数
大人（15才以上）	4 錠	1 日 3 回
5才以上 15才未満	2 錠	
5才未満	× 服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

（1）定められた用法・用量を厳守すること

（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量 1 日量（12 錠）中

五苓散エキス…2.3g

タクシャ……………5.0g	チョレイ……………3.0g
ブクリョウ……………3.0g	ビャクジュツ……………3.0g
ケイヒ……………2.0g	より抽出

添加物として、クロス CMC-Na、二酸化ケイ素、CMC-Ca、タルク、ステアリン酸 Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する

●本剤は天然物（生薬）を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること

（2）小児の手の届かない所に保管すること

（3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）

（4）1 包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2 回以上折り返して保管すること

また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10183377