

2013年4月（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 急性鼻炎・アレルギー性鼻炎などによる 鼻づまり・鼻みすに <鼻炎用点鼻薬>

# カイゲン点鼻薬

第2類医薬品

### 鼻づまり・鼻みすに『カイゲン点鼻薬』でシッカリ解消

かぜによる鼻みすばかりではなく、花粉やハウスダストによるアレルギー性の鼻炎もたいへんうっとうしく、苦しい気分にさせられます。

噴霧式の『カイゲン点鼻薬』は、有効成分の微細な粒子が、鼻腔の奥深くまで均一にゆきわたり、鼻粘膜の炎症をおさえるので、鼻みすが止まり、息苦しい鼻づまりも解消されて、鼻がスッキリしてきます。

一度スプレーした液は逆流しませんので、衛生的に使用できます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
長期連用しないでください



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、線内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みす（鼻汁过多）、くしゃみ、頭重

### 用法・用量


次の1回量を鼻腔内に噴霧してください。  
なお、3時間以上の間隔をおいて使用してください。

年齢	1回量	1日使用回数
成人（15才以上）及び7才以上の中児	1～2度ずつ	1～5回
7才未満	使用しないこと	

### <用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)点鼻用にのみ使用してください。

### 使い方について



キャップをはずし、まっすぐ上向きに持つて、ノズルを軽く鼻孔内にいれてください。

静かに息を吸いながら、1回に1~2度ずつ噴霧してください。(噴霧時は容器を横にしないでください。)

使用後はノズルを清潔なティッシュペーパー等でふきとり、キャップをしてください。)

\*最初にお使いになる時は、薬液が霧状になるまで数回押してください。

\*ご使用前に鼻をかんで、鼻腔の通りをよくしてからお使いください。

### 成分・分量

30mL中に次の成分を含んでいます。

成 分	含量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	15mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻の通りを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、花粉などによるくしゃみ・鼻づまり・鼻みずなどのアレルギー症状をおさえます。
ベンゼトニウム塩化物	3mg	鼻腔内に付着した細菌に対し、殺菌作用をあらわし、清潔にします。

添加物として、塩化Naを含有します。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911

受付時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元

**カイゲンファーマ株式会社**  
大阪市中央区道修町二丁目5番14号

製造販売元

**日東薬品工業株式会社**  
京都府向日市上植野町南開35-3