

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 第②類医薬品

## 解熱鎮痛薬

## エーアイプレミアム

エーアイプレミアムは「イブプロフェン」と「アセトアミノフェン」の2つの解熱鎮痛薬を配合した白色のフィルムコーティング錠です。眠くなる成分は入っていません。

## ⚠ 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

## 3. 服用前後は飲酒しないでください

## 4. 長期運用しないでください



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病

(7) 次の病気にかかったことのある人。

胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病

## \* 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ、青あざができる                                         |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便           |
| 精神神経系 | めまい                                                       |
| 循環器   | 動悸                                                        |
| 呼吸器   | 息切れ                                                       |
| その他   | 目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中痛み、過度の体温低下、からだがだるい |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                        | 症 状                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                           | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 薬剤性過敏症症候群                                                    | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。                                |
| 肝機能障害                                                        | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                                          |
| 腎障害                                                          | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。                                            |

(裏面もお読み下さい)

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無菌性髄膜炎  | 首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。) |
| 心筋梗塞    | しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。                                                                |
| 脳血管障害   | 意識の低下・消失、片側の手足が動かしにくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。                            |
| 間質性肺炎   | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                         |
| ぜんそく    | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                                          |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。                          |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                                                    |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。便秘
4. 3～4回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

### 用法・用量

次の量を、1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。  
服用間隔は6時間以上おいてください。

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数   |
|-----------|---------|----------|
| 成人(15歳以上) | 3錠      | 2回を限度とする |
| 15歳未満     | 服用しないこと |          |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)右図のように錠剤のうっているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

〈錠剤の取り出し図〉



### 成分・分量

3錠〔1回量〕中、次の成分を含有する。

| 成分         | 3錠中   | 主な作用                    |
|------------|-------|-------------------------|
| イブプロフェン    | 195mg | 痛みをおさえるとともに、熱を下げます。     |
| アセトアミノフェン  | 195mg |                         |
| 無水カフェイン    | 120mg | 痛みをおさえる働きを助け、頭痛をやわらげます。 |
| 合成ヒドロタルサイト | 270mg | 胃粘膜を保護し、胃が荒れるのを防ぎます。    |

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー化デンプン、クロスCMC-Na、無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、酸化チタンを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室 〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地  
電話：052-892-1287(代表) 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

**本草製薬株式会社**

名古屋市天白区古川町125番地