

販売名:ハイゼリー-B

〔使用上の注意〕 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	胸やけ、吐き気、下痢

- 2.しばらく服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕滋養強壮、肉体疲労・栄養障害・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、虚弱体質
〔用法・用量〕成人（15才以上）1回1瓶（100mL）を1日1回服用する。なお、15才未満は服用しないこと。●用法・用量を守ること。
〔成 分〕1瓶（100mL）中 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg、ローヤルゼリー200mg、人参エキス90mg（ニンジン600mgに相当）、ゴオウ抽出液200mg（ゴオウ2mgに相当）、イカリ草エキス20mg（イカリソウ200mgに相当）、カルニチン塩化物50mg、ビタミンB₁塩酸塩10mg、ビタミンB₂リン酸エステル3mg、ビタミンB₆5mg、シアノコバラミン1μg、ニコチン酸アミド20mg、パントテン酸ナトリウム10mg、無水カフェイン50mg 添加物:エチルパラベン、ブチルパラベン、安息香酸Na、ポビドン、クエン酸、D-ソルビトール、白糖、カラメル、香



料、トメントール、プロピレングリコール、バコリン、エチルバコリン、グリセリン、トコフェロール、その他1成分（アルコール1.0mL以下）

●本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。
〔保管及び取扱い上の注意〕（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手のとどかない所に保管してください。（3）本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

金属:キャップ、ガラス:瓶

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



〔製造販売元〕東京都中央区日本橋小舟町10-11

ゼリア新薬工業株式会社

お客様相談室 ☎ 03-3661-2080

製造番号

使用期限
[年、月]

ハイゼリーはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。J11N

