



第2類医薬品

傷あとをきれいに


Ato fine⁺
アトファイン

アトファインTM クリーム

傷あとに塗るだけ簡単ケア

非ステロイド外皮用薬

販売名:アトファイン クリーム 内容量:16g



ヘパリン類似物質は「水分保持作用」「血行促進作用」「抗炎症作用」の3つの作用があり、皮ふの再生を促し、皮ふを正常な状態に戻すことで気になる傷あとややけどのあとなどを目立たなくします。

【上手な使い方】

本品は傷あとのことを考えてつくられた皮ふの改善治療薬です。

一度に多量に塗ると白く残る場合があります。

傷あとの大きさに合わせて適量を指に取り、やさしくゆっくりと

傷あとにすりこむか又はガーゼなどにのばして貼ってください。

裏面もお読みください。

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。
(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
(2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
- 次の部位には使用しないでください。: 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)

⚠ **相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3、5～6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかざれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか又はガーゼなどにのばして貼ってください。

■用法・用量に関連する注意

- 使用のつどキャップをしっかりしめてください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 出血のあるきずには使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります)
- かさぶた、顔面にあるきずあと、顔面にあるやけどのあとには使用しないでください。

成分・分量(100g中)

ヘパリン類似物質 0.3g
(はたらき: 水分保持作用、血行促進作用、抗炎症作用)

添加物として、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレンアラキルエーテル・ステアリルアルコール混合物、ベヘニルアルコール、軽質流動パラフィン、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 α -オレフィンオリゴマー、水酸化カリウム、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、パラベン、キサンタンガム、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液を含有する

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)

製品のお問い合わせはお買い求めの販売店又は下記にお願いいたします。
ニチバン株式会社 お客様相談室
TEL: 0120-377218
受付時間: 9:00～12:00、13:00～17:00(土日、祝日を除く)

【発売元】ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

TMは商標です。

【製造販売元】日本ゼトック株式会社

〒163-0512 東京都新宿区西新宿1-26-2