

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### △使用上の注意

**❌してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



#### ■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 本品を5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

販売名:かゆみ止めパッチα 第3類医薬品

【包装】48枚入(24枚×2袋)(直径3cmの円形)

【効能又は効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法及び用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付してください。

#### 〈用法及び用量に関連する注意〉

(1) 用法及び用量を厳守してください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 外用にのみ使用してください。

(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。

(5) 本剤を同じ所に長時間続けて使用しないでください。

#### 【成分及び分量】膏体 100g中

ジフェンヒドラミン(かゆみ止め成分)・・・1.0g

イソプロピルメチルフェノール(殺菌成分)・・・1.0g

トコフェロール酢酸エステル(血行促進成分)・・・0.5g

l-メントール(冷涼成分)・・・3.0g

添加物としてスチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスポリイソプレンゴム、BHT、流動パラフィン、その他2成分を含有します。※本剤にはステロイドを含んでおりません。

#### 【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 小児の手の届かない所に保管してください。(2) 直射日光

の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(3)

他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に

入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(誤用

の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)(4) 使用

期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) 開封後は、

使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

#### 〈消費者相談窓口〉

株式会社金冠堂 お客様相談室

TEL 03-3421-6171(代表)

受付時間 9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

©Benesse Corporation/しまじろう

「しまじろう」は(株)ベネッセコーポレーションの登録商標です。

ここを押して  
開けてください



4 987062 561006