



メンソレータム®  
**エクシブ**®EX

スプレー  
さらさらパウダーin

水虫・たむし用薬

第②類医薬品

【販売名】メンソレータムエクシブEXスプレー

### ⚠️ 使用上の注意

■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. **次の人は使用しないこと** 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
2. **次の部位には使用しないこと** (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等 (2) 湿疹 (3) 湿疹、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

■相談すること

1. **次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること** (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 乳幼児 (4) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 患部が顔面又は広範囲の人 (6) 患部が化膿している人 (7) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人 (陰のうがかゆみかただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い)

2. **使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**  
皮膚かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカ)のような皮フのはがれ、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮フの亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤\*、かゆみ\*、はれ\*、じんましん\*

\*: 全身に発現することもある。

3. **2週間以上使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、本剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

【効能】水虫、いんきんたむし、ぜにたむし  
【用法・用量】1日1回、適量を患部に噴霧する  
<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法を厳守すること (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (3) 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (5) 外用にのみ使用すること (6) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないこと (7) 使用前によく振ること (8) 患部まで10cmの距離で噴霧すること。なお、噴霧口をよく極かめ、顔面特に目に向けて噴霧したり、吸入しないこと (9) 凍傷などの恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないこと  
☆缶を横向きに使用しないこと

【成分・分量】(原液100g中)

テルピナフィン塩酸塩…1.0g、イソノルビルメチルフェノール…1.0g、クロルフェニラミンマレイン塩酸…0.5g、クロタミン…1.0g、リトカイン…2.0g、グリチルリチン酸…0.5g、添加物DME、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、アジピン酸ジイソノルビル、タルク、セスキオレイン酸ソルビタン、エタノール、香料

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと (4) 本剤は合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や布等に当たらないようにすること (5) 火気近づけないこと  
本品は缶の外側を透明フィルムで包んでいます。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

●本品はフロンガスを使用していません

内容量:60g 原液13.5mL 火気厳禁

●暖房器具(ファンヒーター等)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと  
●燃焼のときは、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること

ロート製薬株式会社 TEL:06-6758-1230 アルミ缶/プラスチック/外装フィルムキップ  
大阪市生野区箕西1-8-1 受付時間9:00~18:00(土、祝日を除く) 使用期限:缶底に記載 (Ⓐ)