

貯 法	室温保存	承認指令書番号	農林水産省指令 23 動薬第 3192 号
		販売開始	2009 年 5 月

使用前に必ず本書を読み、内容を理解したうえで使用してください。
また、本書を必要なときに参照できるように大切に保管してください。

動物用医薬品

フェニルピラゾール系殺虫剤

マイフリーガード® 猫用

本剤はフェニルピラゾール系化合物であるフィプロニルを含有するノミ・マダニ駆除剤です。
フィプロニルは、ノミやマダニの塩素イオンチャンネル内のGABAレセプターに主に結合し、神経細胞内の塩素イオンの流入を阻止することで殺虫効果を示します。
2 週間に 1 度のシャンプーでも効果が持続することを投与試験で確認しております。

【成分及び分量】

本剤 1 mL 中
フィプロニル…………… 100.0 mg

【効能又は効果】

猫に寄生するノミ、マダニの駆除

【用法及び用量】

12 週齢以上の猫の肩甲骨間背部の被毛を分け、皮膚上に直接 0.5 mL 入り容器 1 個全量を滴下する。

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は獣医師の指導の下で使用するこ ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 ・猫以外の動物には使用しないこと。特にウサギに使用しないこと。 (使用者に対する注意) ・内容液を直接手で触らないこと。 ・本剤投与後、完全に乾くまで(通常 4 時間程度)は投与部位に直接触れないこと。また、投与したことを知らない人も触れないように注意すること。特に、小児がいる多頭飼いの家庭で複数の猫に同時に本剤を投与する場合は、投与した猫と小児との接触を避けること。 ・飲食をしながら投与しないこと。 ・喫煙をしながら投与しないこと。 (猫に関する注意) ・本剤を 12 週齢未満の猫には、使用しないこと。 ・本剤使用前後 2 日間は、水浴あるいはシャンプーを行わないこと。 ・衰弱、高齢、妊娠中あるいは授乳中の猫あるいは薬物治療を受けている猫に対して使用する場合には獣医師に相談すること。 ・本剤は外用以外に使用しないこと。 ・本剤は 1 回投与すると通常約 1 カ月間、ノミ及びマダニの新規の寄生を防御することができるので、次の投与はそれを考慮して行うこと。 ・本剤の先発製剤の安全性試験は 4 週間以内の投与間隔で実施していないことから、本剤の最短投与期間は 4 週間とすること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本剤の外観又は内容物に異常が認められた場合は使用しないこと。 ・本剤は有効期間を設定してある動物用医薬品なので使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。 ・本剤のボトル型については、使用後に専用のノズルキャップを装着して保管し、開封後は 12 カ月以内に使い切ること。ただし、開封後 12 カ月以内であっても使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
--

- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・本剤が誤って眼、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗淨やうがい等を行い医師の診察を受けること。
- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・内容液が皮膚に付着した場合は、まれに一過性の皮膚反応が起こることがあるので、作業後は石けん等で手をよく洗うこと。

(猫に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・もし、動物が舐めた場合、溶媒の性状のため一過性の流涎、アルコール様中毒症状（嘔吐、食欲不振）が観察されることがある。そのため、本剤投与後乾燥するまではお互いに舐めないように注意すること。
- ・まれに、他の外用殺虫剤と同様に、本剤を使用後、個体差による一過性の過敏症（投与部位の刺激によるそう痒、発赤、脱毛）が起こることがあるので、症状が持続又は悪化する場合は、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・まれに、溶媒の性状のため本剤を投与した部位の被毛に脱色や変色が起こることがある。
- ・猫の眼に入らないように注意すること。傷のある皮膚には滴下しないこと。
- ・万が一、皮膚に異常を来した場合は、直ぐに水洗して薬液を洗い流すこと。

(取扱い上の注意)

- ・本剤のボトル型はポンプを 1 回押すごとに規定量が吐出されるように設計されているが、ポンプを装着した後、最初の 5 回分の液には空気等が入る可能性があるため捨てること。また、長期間使用しない場合も同様に操作すること。

【有効期間】

36 カ月

【包 装】

0.5 mL × 6 個（ブリストア包装）

0.5 mL × 30 個（ピロー包装）

火気厳禁

危険物第四類第三石油類 危険等級Ⅲ グリコール類

【製品情報お問い合わせ先】

フジタ製薬株式会社

〒193-0942 東京都八王子市梶田町1211

電話 (042) 661-5528 (代)

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

製造販売元



フジタ製薬株式会社

東京都品川区上大崎2丁目13番2号

<http://www.fujita-pharm.co.jp>

FUJITA PHARM