

## アズマリン葛根湯シロップ（一般用の場合）

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### 第2類医薬品 アズマリン葛根湯シロップ

#### 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

(9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。   |
| 肝機能障害               | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヶ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

#### 用法・用量

次の量を1日2回食間に、よく振ってから服用してください。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15歳以上） | 1本      | 2回     |
| 15歳未満     | 服用しないこと |        |

定められた用法・用量を厳守してください。

**成分・分量** 2本(90mL)(大人1日服用量)中,次の成分を含有します.

| 成 分                                                               | 2 本中 |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 葛根湯エキス(カッコン8g,マオウ4g,タイソウ4g,ケイヒ3g,シャクヤク3g,カンゾウ2g,ショウキョウ1gより得た軟エキス) | 8.3g |

添加物として,白糖,D-ソルビトール,ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油,安息香酸Na,パラベン,香料(1-メントール)を含有します.

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。).
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元

製造販売元 大生堂薬品工業株式会社  
岐阜市六条大溝3丁目3番7号

消費者相談窓口(お客様相談室)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

**【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】**

注意

1. 服用が適さない場合があるので,服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
2. 服用に際しては,説明文をよくお読みください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。