

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ビーエスバンSα

第3類医薬品

120枚入(20枚×6袋)サイズ7.2cm×4.6cm

△使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

👤相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着、皮膚はく離

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂 電話(0942)83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

【用法・用量】

1日数回患部に貼付してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。
- (3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4)皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

【成分・分量】 膏体100g中

サリチル酸メチル・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
メントール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g
トコフェロール酢酸エステル・・・・・・・・・・・・2g
添加物として、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

