

## 第3類医薬品

販売名

コリキュン® ローション  
外用鎮痛消炎液剤 50mL  
ほのかな  
プロッサムミント  
の香り

効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉  
疲労、筋肉痛、打撲、ねんざ、  
骨折痛、しもやけ

特徴

血行促進成分  
ノナン酸  
バニリルアミド  
消炎鎮痛成分  
サリチル酸  
グリコール



デスクワーク、PC、  
スマホの時の  
肩こりに



ポーチにin♪

50mLの  
小さめ  
サイズ



副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 《用法・用量に関する注意》

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 入浴前後の使用はさけてください。
- (7) 入浴時や発汗時に、本剤による刺激感や痛み、熱感を感じる場合があります。これらの症状を強く感じる場合は使用を中止し、患部をよく泡立てた石けんでやさしくなるように洗い、水で流した後、冷水や軽くしぼったぬれタオル等で十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、この箱を持って医師に相談してください。
- (8) 塗布した患部をコタツや電気毛布で温めないでください。
- (9) 皮ふの弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- (10) 本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- (11) スポンジ面をゆっくり患部に押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面にしみ込ませないで使用すると、スポンジが破損する場合があります。また、スポンジ面に、薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジ面をゆっくり患部に数回押し当て、ポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。に塗布してください。

【発売元】株式会社グラフィコ  
東京都中央区築地4-2-7

【お問い合わせ先】

お客様用品相談窓口

受付時間: 平日10:00~16:00

電話: 03-6226-6557

【製造販売元】ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168

MADE IN JAPAN



4 571199 023089

ご使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また、必要な時にすぐ読めるように大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等  
(2)湿疹、かぶれ、傷口

### ⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位 症状

皮ふ 発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 成分・分量 (100g中)

サリチル酸グリコール 3.0g

β-メントール 6.0g

クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g

ニコチン酸ベンジルエステル 0.02g

ノナン酸バニリルアミド 0.012g

添加物: プロピレンジコール、エタノール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 使用後は、必ずキャップを十分にしめて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。横に倒して保管したり、キャップがしつかりしまっていかなかったりすると、まれに薬液が流れ出す場合がありますのでご注意ください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります)品質が変わってしまうことがあります。
- (4) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質があるので、付着しないように注意してください。
- (5) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



# 肩こり

コリキュン®  
ローション

温感タイプ  
ノナン酸バニリルアミド  
配合

腰痛・  
筋肉の  
疲れにも

グラフィコ

50mL

第3類医薬品