

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

のどの炎症による のどの痛み・イガイガ、せきに

VICKS メディカル トローチ

販売名：ヴィックス メディカル トローチ 第2類医薬品 〈鎮咳去痰薬〉

- ◆ヴィックス メディカル トローチは、殺菌・消毒作用のあるセチルピリジニウム塩化物水和物、せきを鎮める*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩、たんを出しやすくするグアヤコールスルホン酸カリウムを配合した鎮咳去痰薬です。
- ◆のどの炎症によるのどの痛みやのどのイガイガ、せきなどの症状に優れた効果を発揮します。
- ◆服用しやすい、抹茶風味のトローチ剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬



相談すること



1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

高熱

- (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害


2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・
のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ



用法・用量

次の量を2時間以上の間隔をおいて、口中
に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 令	1回量	服用回数
8才以上	1錠	1日6回
8才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。
- (4)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っている
PTPシートの凸部を指先で強く
押し、裏面のアルミ箔を破り、
取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだり
すると食道粘膜に突き刺さる
等思わぬ事故につながります)



成 分

1錠中

成 分	分 量	はたらき
セチルピリジニウム塩化物水和物	1 mg	のどを殺菌・消毒します。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	6.25mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきを鎮めます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	22.5mg	のどにからんだたんを柔らかくして出しやすくします。

添加物：トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、還元麦芽糖水アメ、ステアリン酸Mg、l-メントール、アセスル
ファミンK、スクラロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、三酸化鉄、青色1号、香料、バニリン、フェノール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が
変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、
開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://brand.taisho.co.jp/vicks/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)