

この添付文書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要時に読めるように保管してください。

皮膚軟化治療薬【無香料・無着色】

尿素20%+ビタミンE+グリチルリチン酸モノアンモニウム

ノリアス20α


第3類医薬品

◆乾燥してカサカサの手足やゴチゴチになったひじ・ひざ・かかと、ザラザラした肌は、皮膚表面の角質層の水分不足が原因です。健康な皮膚は、適度の水分量を保っているため、皮膚が荒れることはないのですが、現代のエアコン等による除湿環境から、現在では年中皮膚の水分量が失われています。このような結果として、皮膚表面の水分が失われると、皮膚が荒れてカサカサやゴチゴチの状態になります。お年寄りは皮膚の衰えから角質層の水分が失われやすく、また、水仕事が多い方も同様に水分が皮膚表面から失われて肌が荒れやすくなります。

◆ノリアス20αは、荒れた角質を軟らかくする「尿素」
を20%配合し、さらに血流を改善する「ビタミンE」、
荒れて炎症を起こした皮膚を治す「グリチルリチン酸
モノアンモニウム」を配合したクリームで、硬い皮膚、
荒れた手、指、足をなめらかにします。

ノリアス20αは、基剤にも保湿効果のあるスクワランを配合し、敏感肌の方にも使って頂けるよう無香料・無着色でさっぱりした使用感のクリーム剤です。

<イメージ図>



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 顔面、目の周囲、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）等。
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂（ひび割れ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位（ただれ、赤く腫れているところ）。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、びりびり感）、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態 |

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児（15歳未満）には使用させないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (6) 化粧品ではないので、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量

(1.0g中)

| 成 分 | 分量 | はたらき |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 尿素 | 200mg | 角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮膚にしつとり感を与えます。また、乾燥してカサカサになつた角質層表面をなめらかにします。 |
| トコフェロール酢酸エステル | 5mg | 末梢の血行を促して、皮膚表面に十分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮膚表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮膚が生まれます。 |
| グリチルリチン酸モノアンモニウム | 5mg | 患部の炎症を、修復しながら鎮めます。 |

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、グリセリン、プロピレングリコール、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

発売元 日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119

製造販売元 万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

D2605