

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

鎮咳去痰薬

せき、のどの痛み・あれに

第2類医薬品

エフストリントローチ[®]

®登録商標

エフストリントローチは、せきをしずめるフェノールフタリン酸デキストロメトルファンと強い殺菌力をもつ塩化セチルピリジニウムを配合したトローチです。口の中でゆっくり溶かすことにより、のどの痛みや、はれなどを緩和するとともにせきをしずめます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
高熱
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

<効能・効果>

せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

<用法・用量>

次の1回量を2時間以上の間隔をおいて1日6回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして下さい。

	15才以上	15才未満
1回量	1個	服用しないこと
		×

用法・用量に関する注意

- (1) かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) トローチの取り出し方は右図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してから使用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります)
- (4) 15才未満の人は使用しないでください。



<成分・分量>

1個中

成分	分量	はたらき
フェノールフタリン酸 デキストロメトルファン	15mg	せき中枢の働きを抑え、せきをしずめます。
塩化セチルピリジニウム	1 mg	口内に繁殖しやすい病原細菌の増殖を抑え、のどの炎症をやわらげます。

添加物：グリチルリチン酸2K、還元麦芽糖水アメ、ポビドン、ステアリン酸Mg、黄色5号、香料、*l*-メントール

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

 **大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168