

早く治したい「痛いおでき」の治療薬 (おでき・めんちょうなどに)

オデキュアEX


販売名：オデキュアEX

ふいに手で触ったとたん、ズキッと刺すような痛みが走る「頭・首のおでき」。
座っている間中、ズキズキ痛い「お尻のおでき」。しかも、痛みはしつこく一週間以上続くことも…。
そんな体の色々な部位にできる早く治したい「痛いおでき」に。
オデキュアEXは膿が出て、腫れが引く、「痛いおでき」に効果的な治療薬です。

「痛いおでき」の発生メカニズム

「おでき」は、雑菌が毛穴に感染することで生じる「膿」と「腫れ」、つらい「痛み」が特徴的な皮膚疾患です。

〔模式図〕



雑菌が毛穴に侵入・繁殖します。


免疫細胞と雑菌との戦い(炎症反応)が始まり、毛穴が赤く「腫れ」てきます。

免疫細胞と雑菌の死骸である「膿」がどんどん溜まり、「膿んで腫れた」状態に至ります。こうなると、「膿」と「腫れ」が痛みの神経を強く圧迫するようになり、つらい痛みが引き起こされてしまいます。

「膿が出て、腫れが引く」オデキュアEX

「痛いおでき」の治療には、「膿」と「腫れ」のそれぞれにアプローチすることが効果的です。
オデキュアEXは、化膿を抑える「スルファジアジン(抗菌剤)」と、腫れを鎮める「ジフェンヒドラミンサリチル酸塩」を配合。膿が出て、腫れが引くことで、「痛いおでき」をしっかり治療します。

〔模式図〕



化膿に
スルファジアジンが抗菌作用により化膿を抑えます。

腫れに
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩が腫れを鎮めます。

膿が無くなり、腫れ、痛みが緩和

お手当てのポイント①

膿の排出が起きる場合もあるので、気になる方は、塗布後にガーゼ等で覆うことをおすすめします。

お手当てのポイント②

雑菌の再感染により再び悪化することを防ぐため、膿が無くなり、腫れ、痛みが緩和した後も、赤みが治まるまで本剤をご使用ください。

お手当てのポイント③

おできを自分で潰すことはやめましょう。患部へのダメージや雑菌の再感染により、症状が長引いたり、あと残りしやすくなる可能性があります。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (3)患部が広範囲の人。

(裏面につづく)

- (4)湿潤やただれのひどい人。
 (5)深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等に延ばして貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

《チューブの開け方》



成分とそのはたらき

有効成分(100g中)

成 分	分 量	は た ら き
スルファジアジン	5.0 g	抗菌作用により、化膿を抑えます。
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩	0.8 g	腫れを鎮めます。

添加物としてエデト酸Na、オクチルドデカノール、カルボキシビニルポリマー、ステアリルアルコール、ステアリン酸、D-ソルビトール、トリスオオクタン酸グリセリン、フィトステロール、プロピレングリコール、ベヘニルアルコール、ベヘン酸、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸マクロゴール、乳酸、L-乳酸Naを含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お子さまが誤ってオデキュアEXを口にした場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
 ☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)