



2012年6月制定

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



首・顔^{などのイボに}飲む イボコロリ内服錠

第3類医薬品



生薬のヨクイニンから抽出されたエキスを錠剤にしたお薬です。体にやさしく作用し、イボや皮膚のあれに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

いぼ、皮膚のあれ。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	6錠	3回
15才未満7才以上	4錠	
7才未満5才以上	3錠	
5才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 飲み込む際にのどにつめることのないようご注意ください。

成分・分量

本品18錠中（大人1日の服用量）

ヨクイニンエキス・・・1998.0mg

（原生薬換算量：ヨクイニンとして25.974g）

添加物としてアメ粉、結晶セルロース、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

<成分に関連する注意>

本剤は生薬を原料として製造していますので、色や味等が多少異なることがあります。また、錠剤に黒褐色の斑点が見られることがありますが、これはヨクイニンエキスによるものです。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- ④ビンの中の詰め物は、輸送中の破損防止用です。キャップを開けた後は捨ててください。
- ⑤ビンの中に紙に包まれた乾燥剤が入っています。これは服用しないでください。
- ⑥ぬれた手で取扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- ⑦使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

こんな方におすすめします。

首や顔、お腹、背中など、
皮膚の柔らかい部分のイボが
気になる方に

皮膚のあれが気になる方に

お問い合わせ先

製品について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

横山製薬株式会社 お客様相談室

☎(078)911-2948

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



横山製薬株式会社

兵庫県明石市相生町2丁目2番16号

ホームページ <http://www.ibokorori.com>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149-931（フリーダイヤル）