



20861001

この説明文書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

耳なり、肩コリに ナリピット[®]錠

第②類医薬品

ナリピット錠は、気になる耳なり、肩コリを改善する内服薬です。

有効成分ニコチニ酸アミド、パパベリン塩酸塩が、血行を改善し、ビタミンB群が加齢とともに衰えた神経の調子を整え、耳なり、肩コリを改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

15才未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい（眠気等があらわれることがある）

4. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。(4) 今までに他の抗ヒスタミン剤、乗物酔い薬、かぜ薬、鎮咳去痰薬などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人：排尿困難。(6) 次の診断を受けた人：緑内障（例えば、目の痛み、目のかすみ等）、心臓病。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
泌尿器	排尿困難
循環器	血圧上昇

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
□のかわき、眠気、便秘、下痢
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能・効果】

耳鳴症、皮ふ炎、蕁麻疹(じんましん)、にきび、吹出物、肩こり

【用法・用量】

次の量を食後に水又はお湯で服用して下さい

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2~3錠	3回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守って下さい。
- (2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりしめて下さい。

【成分・分量】 9錠中

有効成分	ニコチン酸アミド	180mg	リボフラビン(ビタミンB ₂)	9mg
	パパベリン塩酸塩	45mg	チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB ₁)	90mg
	カフェイン水和物	180mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	18mg
	アロエ末	18mg	アミノ安息香酸エチル	270mg
添加物	セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウ			

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 本剤をぬれた手で扱わないで下さい。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

原沢製薬工業株式会社 お客様相談室

電話: (03) 3441-5191

受付時間: 9:30~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売 

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号