

- 本品は飲まないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 本品を取り扱う時は、ゴム手袋などを使用してください。

第2類医薬品

販売名:ソークリン消毒液 次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v%

⚠ 使用上の注意 (使用前に必ずお読みください。)

相談すること

1. 本品は内服しないでください。また、あやまって飲み込んだ時は、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してください。
2. 目に入らないよう注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
3. 本品の使用により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果、用法・用量

効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首の消毒	哺乳びん・乳首を洗浄、水洗いした後、本剤の80倍液に1時間以上浸す。
医療器具の消毒	本剤の20～50倍液に数分間浸すか、清拭する。
器具・物品などの消毒	本剤の20～50倍液に数分間浸すか、清拭する。
室内・便所・浴室の消毒	本剤の20～50倍液で清拭する。
排泄物の消毒	本剤の1～10倍液を用いる。

用法及び用量に関連する注意

1. 定められた用法・用量を厳守してください。(排泄物の消毒時以外は、原液での使用を避けてください。また、熱湯での希釈は避けてください。)
2. 酸性の洗浄・漂白剤、シアン酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですので混合しないでください。

哺乳びん・乳首の消毒方法

1. 洗浄



哺乳びん・乳首は、授乳後すぐに洗剤で洗い、よくすすぎます。

2. 消毒溶液の準備



キャップ 水 約2リットル
25mL (1杯)
25mL(キャップ内側の水位線1杯)で、消毒溶液2Lが調製できます。

3. 消毒




洗った哺乳びん・乳首に、気泡が入らないよう注意し、消毒溶液に浸します。1時間以上浸すと消毒できます。

4. 調乳



哺乳びん・乳首を取り出し、消毒溶液をよく振り切ってから調乳します。すすぐ必要はありませんが、臭い等が気になる場合は、水道水ですすいでください。



製造販売元
シオエ製薬株式会社
 兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

販売元
Osaki
オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
 お客様相談室 ☎ 0120-15-0039
 (受付時間 10:00～17:00 ※土・日、祝日を除く)

店舗専用

 キャップ:PP, ボトル:PE
 シュリンクフィルム:PET

MADE IN JAPAN
 132025-01
 W90×H277×D90

<http://dacco-web.com>



第2類医薬品

ソークリン 消毒液

次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v%

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

Disinfectant Solution

ホールディングで
持ちやすい



浸すだけですすぎ不要

哺乳びん・乳首
器具などの消毒に



消毒溶液の交換は
1日1回を目安に

1100 mL

日本製

危険

まぜるな
酸性の洗浄・漂白剤、シアン酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですのでおやめください。