

# 肩腰背中キツい痛みに

雲仙散 生薬製剤

[第②類医薬品]

販売名: 雲仙散



## 《特長》

- 濃縮エキス散がさっと溶け、何とかしたいキツい痛みに効きます。
- 16種類の生薬が痛みの出どころにバランスよく作用します。



## 16種類の生薬の作用

### 鎮痛作用

マオウ、シャクヤク、ボウイ、ボタンピ、ボウフウなど9種の生薬が痛みを鎮めます。

### 血流改善作用

ケイヒ、ボタンピなどが血流環境にはたらきかけ、血を巡らせます。

### あたため生薬配合

7種の生薬が筋などを温めます。

### やわらげ生薬配合

カッコンが筋の緊張をやわらげます。

## おくすりの上手な飲み方

- ①最初にひと口分の水やぬるま湯を口にふくんでください。



- ②ふくんだ水やぬるま湯に向けて、おくすりを口の中にふくみます。



- ③さらに、水やぬるま湯をふくんで一緒に飲みほします。

※水でおくすりをサンドするイメージです。



- ④最後に、水やぬるま湯で口の中をゆいで飲みほしましょう。



- 食間(空腹時)に服用してください。●温めるとラクになる痛みなら、服用後の入浴もおすすめです。  
●マッサージなどの施術を受けられている方には、服用と合わせた施術もおすすめです。

※製剤の特性から触感的に固まっているように感じられますが、分包品を振ることにより内容物が固まっていないことを確認できます。

※本剤を服用する際、口中の水分により口の中で固まったように感じることがあります。効果に変わりはありませんのでそのまま服用ください。

## 《摩耶堂のおくすり》

私たち摩耶堂がつくるおくすりは、日本人の体質や生活習慣を考えた独自の処方の和漢薬です。心身の不調をカラダの中から整え、その人本来の健やかな状態を取り戻すお手伝いができます。「大切なひとに、伝えてあげたくなるおくすり」 そう言っていただくことが私たちのよろこびです。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)



授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: 食欲不振、吐き気・嘔吐、軟便、下痢、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病 (10) 次の医薬品を服用している人: 瀉下葉(下剤)

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌尿器	排尿障害

**3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 軟便、下痢**  
**4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

**【効能・効果】**腰痛、背痛、五十肩、筋肉痛、神経痛、関節炎、リウマチ

**【用法・用量】**次の量を食間に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人	1包	3回
8歳～15歳	1/2包	
4歳～7歳	1/3包	
4歳未満	服用しないこと	

服用時間を  
守りましょう。

<食間>  
食後2～3時間後の  
空腹時を指します。

<用法・用量に関する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分・分量】

1包1.5g・20包中、下記生葉より製したエキスを含有しています。

カンゾウ	5.0g	ショウキョウ	5.0g	ボウフウ	5.0g	ボタンビ	6.0g
ソウジュツ	5.0g	タイソウ	5.0g	シャクヤク	8.0g	トウニン	5.0g
ケイヒ	6.0g	キョウニン	5.0g	カッコン	10.0g	ダイオウ	5.0g
マオウ	10.0g	ボウイ	8.0g	ブクリョウ	6.0g	ヨクイニン	6.0g

添加物としてカルメロースCa、無水ケイ酸を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

#### 【その他】

本剤は生葉を用いた製品ですから、製品により色調が多少異なることがあります、効果には変わりありません。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は、くすりの相談室までお願い申し上げます。

「くすりの相談室」

078-929-0112 9:00～17:30  
(土、日、祝、弊社休日を除く)

製造販売元

ロート製薬グループ

 摩耶堂製薬株式会社  
神戸市西区玉津町居住65-1

<https://www.mayado.jp>

