





ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

- 特長**
- 効きめ成分フェルビナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
 - 肩・腰・関節・筋肉の痛みに優れた効きめをあらわします。
 - ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。
 - α -メントール3.5%配合で、さわやかな清涼感です。

- 微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
- 全方向伸縮で、肌にピッタリフィットします。
- 腰などの広い部位を一枚でおおえる、大判サイズ。

包装 10枚(10cm×14cm)

経皮鎮痛消炎テープ剤 販売名:フェイタス®5.0 第2類医薬品

詳しい情報は▶
こちらへ

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。
- (3)みずしむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹、発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

△ 用法・用量に関する注意

- (1)15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2)定められた用法・用量を守ってください。
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4)汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 (10枚中)

フェルビナク 5.0g α -メントール 3.5g
トコフェロール酢酸エステル (*ビタミンE誘導体) 2.3g

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・ステレノブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光や高温を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (5)使用期限(この箱及び袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。



1BAAA1A