

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



メンソレータム®

メディックN軟膏

鼻などのかゆみ・皮膚炎治療薬

メンソレータム®メディックN軟膏

第2類医薬品

メンソレータム®メディックN軟膏は
鼻の穴入口やまわりのかゆみに効くお薬です。



管理コード
00000000

こんなとき、鼻が痛がゆくてお困りの方に

乾 燥



鼻のかみすぎ



摩擦・こすれ



4つの有効成分が痛がゆい炎症にアプローチ

素早くかゆみを抑える
リドカイン

患部を殺菌
**イソプロピル
メチルフェノール**

かゆみ
炎症

かゆみの原因となる
炎症をおさえる
**プレドニゾン吉草酸
エステル酢酸エステル**

血行を促進する
ビタミンE誘導体

鼻の穴入口にも、鼻のまわりにも使える

鼻の入口に使用する場合

清潔にご使用いただくため、また鼻の中を傷つけないため綿球の下を持ってご使用ください。



※裏面「鼻の穴入口に
使用する場合の注意」
をよくお読みの上、ご
使用ください。

**鼻の入口に
綿棒で塗る**

鼻のまわりに使用する場合

患部にお薬をのせ、擦りこまずにやさしくのばしてください。



**鼻のまわりに
指で塗る**



使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部
(2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
- 顔面には、広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ
皮フ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■**効能・効果** かゆみ、皮フ炎、湿疹、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

■**用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗布してください。
最初にご使用になるときは、キャップを逆さにしてチューブの口に強く押し込んで穴をあけてください。
＜用法・用量に関連する注意＞
(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみご使用ください。

＜鼻の穴入口に使用する場合の注意＞

- 鼻毛の生えているところにのみ使用し、粘膜には使用しないでください。
- 小児(15才未満)は使用しないでください。
- 綿棒で鼻の中を傷つけないように注意してください。
また、鼻の奥まで綿棒を入れないでください。
- 綿棒使用の際は、綿球の下を持って、こすらずにやさしく塗布してください(右図)。
- 化膿しているところには使用しないでください。
- 長期連用しないでください。
- 症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶりかえす方は、医師に相談してください。



■**成分・分量** (1g中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(合成副腎皮質ホルモン) 1.5mg、
リドカイン10mg、イソプロピルメチルフェノール1mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) 5mg
添加物: ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、
N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、流動パラフィン、
ワセリン、パラフィン

■**保管及び取扱い上の注意**
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先: ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: **03-5442-6020**

受付時間 9:00～18:00

大阪: **06-6758-1230**

(土、日、祝日を除く)

〔発 売 元〕 **ロート製薬株式会社**

大阪市生野区巽西1-8-1

〔製造販売元〕 **ジャパンメディック株式会社**

富山市横越168