

【使用上の注意】

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能又は効果】

滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法及び用量】

成人(15才以上)

1日1回1本(50mL)服用

●用法及び用量を厳守して下さい。

●本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。



ガラス:瓶
金 属:キャップ

**滋養強壮・栄養補給
肉体疲労時に!**



販売名:ヘパバイトII

2SF1

【成分及び分量】 本品1本(50mL)中

肝臓加水分解物250mg
ビタミンB65mg
ニコチン酸アミド25mg
タウリン1500mg

添加物としてクエン酸Na、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、アセスルファムK、カラメル、バラベン、安息香酸Na、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、パニリン、トコフェロール、プロピレングリコール、香料を含有します。

(アルコール含有0.4mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。


【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元 **伊丹製薬株式会社**

滋賀県高島市今津町下弘部280番地
[お問い合わせ先] TEL 0740-22-2059

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149931



使用
期限

製造
番号