

お問い合わせ先:エーザイ
0120-161-454



■使用上の注意 [相談すること] ①服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 皮膚:発疹 消化器:胃部不快感 ②服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢 ③1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ■効能・効果 次の諸症状の緩和:肌あれ、にきび・吹き出物、口内炎、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、舌の炎症、赤ら顔に伴う顔のほてり、目の充血、目のかゆみ 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」 次の場合のビタミンB₂の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 ■用法・用量 成人(15歳以上)は、1日1回1瓶(50mL)を服用してください。 ○小児(15歳未満)には服用させないでください。 ■1瓶(50mL)中の成分 ビタミンB₂リノ酸エステル38mg、ビタミンB₆ 50mg、ビタミンB₁硝酸塩10mg、ニコチニ酸アミド60mg、ビオチン500μg、ヨクイニンエキス200mg(ヨクイニンとして2600mg)、グルクロノラクトン200mg 添加物として、安息香酸Na、エタノール(0.1mL)、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、香料、アセスルファムK、エリスリトール、スクロース、ステビア抽出物、没食子酸プロピル、ボビドン、DL-リンゴ酸、pH調整剤 ○本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります、これは本剤に含まれているビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。 ■保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)本剤は生葉エキスを配合しているため、漏りを生じることがあります、効果には変わりありません。(5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

50mL

ガラス:びん 使用期限

金属:キャップ

副作用救済制度 製造番号
0120-149-931