

60g

開封口

クリニラボ ヘパリオクリーム  
皮膚用薬 第2類医薬品

3つの有効成分が、  
乾燥により荒れた肌組織を  
修復し治します

ヘパリン  
類似物質



アラントイン

皮膚修復作用

保湿作用

抗炎症作用

抗炎症作用



トコフェロール  
酢酸エステル

血行促進作用

こんな時におすすめ

お風呂  
あがりの  
乾燥対策に

粉ふき・  
ガサガサの  
手足に

赤ちゃんの  
保湿にも

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

(注意) (1)定められた用法・用量を守ってください。  
(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります)※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

お客様 119 番室 ☎ 03-3985-1800  
※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発 売 元 大 正 製 薬 株 式 会 社  
東京都豊島区高田 3丁目 24番 1号  
製造販売元 万 協 製 薬 株 式 会 社  
三重県多気郡多気町五桂 1169-142



効能

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

成 分 (100g 中)


ヘパリン類似物質 ..... 0.3g  
アラントイン ..... 0.2g  
トコフェロール酢酸エステル ..... 0.5g  
添加物: グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、フロビレングリコール、セラミド、セラレジン、バラベン、エデチ酸 Na、ヒアルロン酸 Na

使用前に、箱に記載の説明文  
を必ず読んでください。必要な  
時に読めるよう、この箱を  
保管してください。

# ヘパリン

## 類似物質 0.3%

+ 皮膚修復  
+ 血行促進  
成分配合



CLINILABO

# ヘパリオ クリーム

HEPARIO CREAM

乾燥により荒れた肌を  
修復し治す

しっとり・べたつきにくいクリーム



〈無香料〉

第2類  
医薬品

使用上の注意

■してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください (1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病などの人)。(2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(出血凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください 目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931