

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

下痢・食あたり・水あたり
止しゃ薬（下痢止め）

マツ
ワカ末錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
- (3) 高齢者

2. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回食後に服用。



下痢



はき下し

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量12錠（1錠240mg）中、ベルベリン塩化物水和物㊟を300mg含有しています。

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ゼラチン、タルク、セルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。
開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



ワカ末錠

Read before using and retain for future reference.

For diarrhea, food poisoning and water poisoning

Antidiarrheal

WAKAMATU TABLETS

Precautions

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before using this medicine.
 - (1) Patients undergoing medical treatment from a physician.
 - (2) Those who have diarrhea with fever, bloody stool or persistent mucous stool.
 - (3) The elderly.
2. If your symptoms do not improve after 5 to 6 days of use, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

Indications

Diarrhea, diarrhea due to indigestion, food poisoning, vomiting with diarrhea, water poisoning, loose bowels, and soft stool.

Dosage and administration

Take the following dose 3 times per day after meals.

Age	Dose	Doses per day
Adults (15 years and over)	4 tablets	3
Children 8 to 14 years	2 tablets	3
Children under 8 years	Do not use	

Dosing precautions

Administer to children under adult supervision.

Composition

12 tablets (240 mg per tablet) to be taken per day contain 300 mg of berberine chloride hydrate. The additives lactose, corn starch, gelatin, talc, microcrystalline cellulose, and magnesium stearate are contained.

Precautions for storage and handling

- (1) Store in a cool dry place away from direct sunlight.
- (2) Keep out of reach of children.
- (3) Do not transfer the medicine to a different container. (It may lead to misuse or alter the quality of the drug.)

Distributed by **Kracie Pharmaceutical, Ltd.**
20-20, Kaigan 3-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-0800, Japan.

Manufactured and
Distributed by **Kracie Pharma, Ltd.**
20-20, Kaigan 3-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-0800, Japan.

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)