

ビタミンB₂B₆
主薬製剤

第3類
医薬品

販売名：ヨクイノーゲンBC錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

3.1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈効能〉

次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび、口内炎、湿疹、皮膚炎、口角炎、口唇炎、舌炎、かぶれ、ただれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB₂B₆の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〈用法・用量〉

1日3回食後、口の中で溶かすか、またはかみくだいて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回
15才未満7才以上	1錠	
7才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分〉

成人1日の服用量6錠(1錠350mg)中

リボフラビン酪酸エステル……………20mg
(ビタミンB₂酪酸エステル)

ピリドキシン塩酸塩……………100mg
(ビタミンB₆)

アスコルビン酸……………300mg
(ビタミンC)

ヨクイニンエキス……………540mg
〔ヨクイニン7gに相当〕

添加物として、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、エリスリトール、CMC-Ca、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

〔成分に関連する注意〕

(1)本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色くなることがあります。

(2)本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。また、錠剤の表面に赤色の小さな斑点がみられる場合がありますが、これはリボフラビン酪酸エステルによるものです。

●ビタミンB₂、ビタミンB₆が脂質代謝やタンパク質の代謝に関与して、皮膚や粘膜を健全に保ちます。

●コラーゲンの生成を助けるビタミンCと肌あれに効くヨクイニンエキスを配合した医薬品です。

●シュガーフリーで、水なしで服用できる**チュアブル錠**(口の中でかみくだいて服用する錠剤)です。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931