

**お試しサイズ**  
5日分 60錠

**のみやすい  
フィルムコート錠**  
原寸大

**Kracie**

**コッコアポ® EX錠**

**脂質代謝を上げる**

**食べすぎ・便秘のためこみ太りに**

**お腹まわりの余分な脂肪や便秘に効く**

**漢方製剤**

**防風通聖散**  
ぼうふうつうしょうさん

**第2類医薬品 | 肥満症・肥満に伴う便秘**

**60錠(5日分)**

**[効能]**体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症:高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症  
**[用法・用量]**次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。  
 成人(15才以上)1回4錠、15才未満は服用しないこと

**おなかの皮下脂肪が多く便秘がちな方の肥満に、脂質代謝を上げて余分な脂肪を分解・燃焼して減らします。**

**8<切り取り線>**吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること  
 ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

**販売名:コッコアポEX錠 60錠 漢方製剤 第2類医薬品 チャック**

**△ 使用上の注意**

**【 してはいけないこと】**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の薬下薬(下剤)  
 2.授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

**【 相談すること】**

1.第一次は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸が弱く下痢しやすい人 (5)発汗傾向の強い人 (6)高齢者 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8)次の症状のある人 むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、けいれん、腹痛
精神・神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等があらわれ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢、便秘

4.1ヶ月位(便秘に服用する場合には1ヶ月間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

5.長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**[成分]**成人1日の服用量12錠(1錠390mg)中  
 防風通聖散エキス(3/5量) ..... 3,420mg  
 トウキ・シャクヤク・セイキウ・サンシン・レンギョウ・ハルカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.72g、ショウキョウ0.24g、ダオウ0.9g、無水ボウショウ0.45g、ビャクジツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッカ各1.2g、カッセキ1.8gより抽出。  
 添加物として、二酸化ケイ素、フルコMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、還元麦芽糖水アメ、マクロゴール、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、カルナバロウを含有する。  
**[保管及び取扱い上の注意]**(1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとしめて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元 **クラシエ 薬業株式会社**  
 東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)  
 ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334  
 受付時間 10:00~17:00(土・日、祝日を除く)

製造 **クラシエ 製薬株式会社**  
 販売元 東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

副作用被害救済制度の問い合わせ先 ☎0120-149-931  
 (登録商標 10031 H09 1)

製造番号  
 PE, 金属