

お試しサイズ
5日分 60錠

のみやすい
フィルムコート錠
原寸大

Kracie

コッコアポ® L錠

水分代謝を上げる

下半身が
太くみえる
**むくみや
脂肪に**

✓夕方などに脚が
むくみやすい
✓水太り体質

**漢方
製剤**

防己黃耆湯
ぼういおうぎとう

第2類医薬品 肥満症・むくみ

体力中等度以下で、疲れやすく、
汗のかきやすい傾向がある方に

60錠(5日分)

のりやさしい
フィルムコート錠
原寸大

8<切り取り線> 吸湿しやすいため、服用のつづチャックをしっかりとしめること
ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名:コッコアポ L錠 漢方製剤 第2類医薬品 チャック

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人 むくみ。(6) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等があられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能] 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症:肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶどう)

[用法・用量] 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
成人(15才以上) 1回4錠、15才未満5才以上1回2錠、5才未満は服用しないこと

<用法・用量に関する注意> 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分] 成人1日の服用量12錠(1錠351mg)中
防己黄耆湯エキス 3,200mg
(ボウイ・オウギ各5.0g、ピヤクジュツ・タイソウ各3.0g、カンゾウ1.5g、ショウキョウ1.0gより抽出。)
添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素、CMC-Ca、クロスCMC-Na、水酸化Al/Mg、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ヒプロメロースを含有する。

<成分に関する注意> 本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

[保管及び取扱い上の注意] (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとしめて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元 クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)
ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎ (03)5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造 クラシエ 製薬株式会社
販売元 東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

副作用被害救済制度の問い合わせ ☎ 0120-149-931
④登録商標 10036 H08 1

製造番号
PE, 金属
使用期限