

この説明書は、お薬とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

Santen

第2類医薬品

年齢・乾きなどによる目の疲れに。目のかすみ^{*1}に。

涙液安定化成分^{*2}などの5つの有効成分^{*3}最大濃度配合^{*4}

サンテ メディカルプラス アクティブ[®][眼科薬]

年齢を重ねるとともに増える『細かな文字が読みづらい』、『夕方になると目がしょぼしょぼする』などのつらい目の悩み。それは、年齢とともに涙の分泌量が減少し、目が乾いていることなどが原因の1つかもしれません。

サンテ メディカルプラス アクティブは、涙成分(ムチン)の分泌を促進し、涙を安定化させるレチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)、目の表面を保護しうるおいを与えるコンドロイチン硫酸エステルナトリウム、血流を改善して目の疲れを改善するビタミンE(酢酸d- α -トコフェロール)をはじめとした、5つの有効成分^{*3}を最大濃度配合^{*4}し、計9種の有効成分を配合。年齢による目の機能低下などが原因の目のトラブルに効果を発揮する目薬です。

*1 目やにの多いときなど

*2 レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)

*3 レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、天然型ビタミンE(酢酸d- α -トコフェロール)、ネオスチグミンメチル硫酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩

*4 一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大濃度配合(承認基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと)

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い
- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 - 目のかすみが改善されない場合
 - 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

●次の注意事項をお守りください。

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。



効能・効果

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

成分・分量

成分	分量	はたらき
ビタミンA (レチノールパルミチン酸エステル)	5万単位/ 100mL	涙成分(ムチン)の分泌を促進するとともに、涙を安定化させ、角膜を保護します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%	角膜を保護するとともに、涙の蒸発防止作用により目に関するおいを与えます。
天然型ビタミンE (酢酸d- α -トコフェロール)	0.05%	末梢血管の血液の流れをよくします。
タウリン	0.5%	目の組織代謝を活発にします。
L-アスパラギン酸カリウム	0.5%	目の組織呼吸を高めます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	遠近調節機能改善作用により、目の疲れなどを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンの働きを抑え、目の炎症・目のかゆみを抑えます。
イプシロン-アミノカプロン酸	2.0%	炎症の原因となる物質の産生を抑えます。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.01%	結膜(白目の部分)の充血を抑えます。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、デキストラン、ヒアルロン酸ナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、BHT、d-ボルネオール、L-メントール、等張化剤、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。



包装 12mL

[自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。]

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」

電話番号 0120-127-023 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また回答の質の維持・向上のため、
お電話を録音させていただいております。