

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

生薬のチカラで
くり返すニキビを治す

ネオ小町

Neo KOMACHI

第2類医薬品

皮膚病用内服薬

販売名:ネオ小町錠

ネオ小町錠は、ニキビを身体の中から治すお薬です。

12種類の生薬

キキョウ・センキュウ・ダイオウ・オウゴン・トウキ・
ボタンピ・ヨクイニン・ケイヒ・ケイガイ・レンギョウ・
サンキライ・ニンドウ

余分な老廃物や
膿を身体の外へ出す

5種のビタミン+メチオニン*

ビタミンB2/B6/C・ニコチン酸アミド
パントテン酸カルシウム

※必須アミノ酸の一種で体内ではシステインの基になる化合物

お肌に
必要な成分を補う

※イメージ図

2つのアプローチでターンオーバーを整え、 今あるニキビやニキビ跡*を治し、 新しいニキビがでにくいお肌へ。

※色素異状沈着のこと

飲み方アドバイス

どのくらい
飲めばいいの?

まずは、1回3錠・1日3回から始めてみてください。
〈お腹がゆるくなってしまう方〉→1日の回数を2回に減らしてみてください。
〈なかなか効果が感じられない方〉→1回の量を4〜5錠に増やしてみてください。

いつ
飲めば効果的?

「ネオ小町錠」はいつでも服用できますが、生薬がベースとなっていますので
食前または食間に服用するのがおすすめです。
胃腸が弱い体質の方は、胃腸への負担を考え食後に服用することをおすすめします。

和漢のチカラを科学し、あなたへ。 ～摩耶堂製薬～

漢方薬に日本の生薬「和薬」等を配合したものを「和漢薬」といい、日本人の体質に合わせて
心身の不調をお手当てすることを目指しています。『摩耶堂製薬』のお薬は、和漢薬にさらに
独自の工夫を加え、カラダの内側から効き目を現す処方です。現代社会がもたらす様々な
心身の不調を整え、あなたの本来の健やかさを。摩耶堂製薬の想いです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
5歳未満の乳児・幼児(錠剤がのどにつかえることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

裏面に続きます。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(6)次の症状のある人：食欲不振、吐き気、嘔吐、軟便、下痢 (7)次の医薬品を服用している人：瀉下薬(下剤)
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、軟便、下痢
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

ニキビ、吹出物、シミ、ソバカス、色素異状沈着、ジン麻疹、湿疹、皮ふ炎、痒疹、アセモ、皮ふ掻痒症、口唇炎、口唇キ裂、アレルギー体質、シモヤケ、アカギレ等の治療と予防

【用法・用量】

通常1回3～5錠・1日2～3回、水又はお湯で服用してください。

なお、年齢・症状に応じ適宜増減してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】10錠中

キキョウ	200.0mg	サンキライ	200.0mg
センキュウ	200.0mg	ニンドウ	150.0mg
ダイオウ	250.0mg	ニコチン酸アミド	100.0mg
オウゴン	200.0mg	リボフラビン(ビタミンB ₂)	5.0mg
トウキ	150.0mg	ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	20.0mg
ボタンピ	200.0mg	アスコルビン酸(ビタミンC)	200.0mg
ヨクイニン	300.0mg	DL-メチオニン	80.0mg
ケイヒ	150.0mg	パントテン酸カルシウム	25.0mg
ケイガイ	150.0mg	乳酸カルシウム水和物	340.0mg
レンギョウ	150.0mg		

添加物としてマクロゴール、ゼラチン、タルク、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、銅クロロフィリンNa、アラビアゴム、白糖、セラック、ヒプロメロース、乳糖、セルロース、炭酸Ca、カルナウバロウを含有する。

<成分・分量に関連する注意> (1)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから心配ありません。(2)ビタミンCを含有する製剤は、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。従って、医師の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。(5)ビンの中の詰め物は輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。(6)箱とビンの「開封年月日」記入欄にビンを開封した日付を記入してください。(7)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。(8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】本剤の緑色は葉緑素(銅クロロフィリンナトリウム)でタール色素は含んでいません。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
くすりの相談室までお願い申し上げます。

「くすりの相談室」 神戸市西区玉津町居住65-1
078-929-0112 9:00～17:30
(土、日、祝、弊社休日を除く)

製造販売元



ロート製薬グループ

摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1