


山本漢方葛根湯エキス顆粒

【特徴】

- 葛根湯は、漢方薬の原典である、中国の医書「傷寒論」でもっともよく知られている薬方の一つです。
- 感冒、頭痛、肩こり、筋肉痛などの症状に効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法及び用量】 次の量を1日3回、食前又は食間に水又は白湯にて服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包（2.0g）	3回
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上7歳未満	1/2包	
2歳以上4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないでください。	

〈用法及び用量に関連する注意〉

服用に際して、次のことに注意してください。

- 本剤は定められた用法及び用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分及び分量】 大人1日の服用量3包（6g）中

本品 1日量 3包（6g）中

日本薬局方 カッコン 4.0g 日本薬局方 マオウ 2.0g

日本薬局方 タイソウ 2.0g 日本薬局方 ケイヒ 1.5g

日本薬局方 シャクヤク 1.5g 日本薬局方 カンゾウ 1.0g

日本薬局方 ショウキョウ 0.5g

上記生薬より得た葛根湯エキス（1/2量）3.0gを含む

* 添加物として結晶セルロース、乳糖水和物、メタケイ酸アルミニウムマグネシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）。
- 使用期限（外箱に記載）の過ぎた製品は服用しないでください。

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

お問い合わせ ☎ 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日は除く)

ホームページアドレス <http://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地