

効能効果

口腔・咽喉のはれ、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法用量

1回約10滴(約0.4mL)を水又は微温水約100mLに薄めて、1日数回うがいしてください。
(用法用量に関連する注意)

- (1)用法用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)うがい用にのみ使用してください。
- (4)使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用してください。
- (5)原液のまま使用しないでください。

成分分量

100mL中 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物0.5g、セチルピリジニウム塩化物水和物1.25g含有
添加物：L-メントール、エタノール、リン酸水素ナトリウム水和物、pH調整剤


保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)火気に近づけないでください。

使用法



- ①キャップをはずして容器を逆さに持ち、指でゆっくり押し、計量カップに約10滴(約0.4mL)をとります。



- ②100mLの目盛まで水又は微温水を加えて薄めてから、数回うがいしてください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号(06)6231-5822
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



お口やのどのはれ、
殺菌・消毒、口臭の除去に

第3類医薬品

計量
カップ付 120mL

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

販売名：健栄うがい薬アズレンCPC

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 口内のひどいただれのある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください