

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

◎必ず、お子様の手の届かないところに、このお薬を保管して下さい。

Ⓐ

オゾこども 鼻炎シロップ

第②類医薬品

鼻みず／鼻づまり

⚠ 使用上の注意

(本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。)

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

2 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気等があらわれることがあります。)

3 長期連用しないで下さい

必ずお守り下さい



相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ① 医師の治療を受けている人。
- ② 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ③ 授乳中の人。
- ④ 高齢者。
- ⑤ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ⑥ 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- ⑦ 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

口のかわき、眠気

4 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(裏面もお読みください。)

用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。なお、場合により約4時間毎に1日6回まで服用することができます。

年 齢	1 回 量	服用回数
11歳以上15歳未満	10mL	1日3回
7歳以上11歳未満	7.5mL	
3歳以上7歳未満	5mL	
1歳以上3歳未満	3.5mL	
6カ月以上1歳未満	3mL	
3カ月以上6カ月未満	2.5mL	
3カ月未満	服用しない	


<用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
 - 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させて下さい。
 - 過量服用等に注意し、用法・用量を厳守して下さい。
- ◎添付の目盛付きコップで量り、使用のつどよく洗い、本剤とともに清潔に保管して下さい。

お子さまの誤飲を防ぐ安全キャップの使い方

●開け方

- ① テーブル等平らな所に置きキャップを下に強く押しながら
- ② 矢印の方向に回して開けてください。



●閉め方

- びんの口の周囲をよくふいてから、キャップをしっかり閉めてください。

※キャップを押さずに回すとカチカチと音がして空回りします。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)




本品の成分・分量と作用

成 分	分量(60mL)中	作 用
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	かぜの初期にみられる鼻みず、鼻づまり、くしゃみに効きます。
d l-メチルエフェドリン塩酸塩	55mg	鼻粘膜の充血・はれをおさえ、鼻づまりをしずめます。
サイシン流エキス (原生薬換算量240mg)	0.24mL	鼻みず、鼻づまりなどの症状をやわらげます。

添加物として、白糖、果糖、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ブチルパラベン、安息香酸ナトリウム、エチルアルコール、プロピレングリコール、カラメル、バニリン、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
 - 2 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - 3 他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - 4 服用のつどビンの口の周囲を清潔に拭いてからキャップをしめて下さい。
 - 5 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。
 - 6 一度フタをあげた後は、使用期限内でも、なるべく長期間の使用はしないで下さい。
- ※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがありますが、よく振ってから服用して下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

明治薬品株式会社 お客様相談室

電 話：0120-53-3451

受 付 時 間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地