



第2類 医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

漢方薬 かぜのひき始め、筋肉の痛み、肩こりに サトウ葛根湯顆粒〈満量処方〉

サトウ葛根湯顆粒〈満量処方〉は…

- 漢方薬「葛根湯(かっこんとう)」をのみやすい顆粒にしました。
- 「葛根湯」は、中国で著わされた「傷寒論(しょうかんろん)」に記載されている漢方薬です。
- かぜのひき始め、鼻かぜ、肩こりなどに効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全 身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効能】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

下記の1回服用量を服用します。朝昼夕、食前または食間にそのまま水かお湯にて服用してください。またはお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上 7才未満	1/2包	
2才以上 4才未満	1/3包	
2才未満	服用しないでください	

※食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】3包中(1包1.6g)

葛根湯エキス4.4g

〔カッコン 8g、マオウ 4g、タイソウ 4g、ケイヒ 3g、シャクヤク 3g、
カンソウ 2g、ショウキョウ 1gより抽出。〕

添加物として、D-マンニトール、アセスルファムK、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然物を用いていますので顆粒の色が多少異なることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



◎このような時におのみください

- かぜのひき始めの熱、寒け、頭痛、のどの痛み、関節痛、筋肉の痛みなどがあり、汗が出ないとき。
- 鼻かぜによるくしゃみ、鼻水、鼻づまりがあるとき。
- 肩がはった感じで頭が痛いとき。
- 首すじから肩・腕にかけて、こりや痛みを感じる時。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kentouhiga_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号