

第②類医薬品

非ピリン系総合感冒薬
小児用 新オムニンA

小児用新オムニンAは「かぜ」による11の諸症状を緩和する6種のすぐれた有効成分を配合した総合感冒薬です。甘くて飲みやすいシロップ剤ですから、お子様の服用に適しています。

! 使用上の注意

本品は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意として成人が服用される際のことも記載しております。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります。）
4. 服用前後は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人は (4) 高齢者 (5) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人：高熱、排尿困難 (7) 次の診断を受けた人：心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 呼吸器 | 息切れ、息苦しさ |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[成分・分量]

| 成 分 | 30mL中 | 主 な 作 用 |
|------------------------|-------------------------------|---|
| 非 ピ リ ン 系 解 热 鎮 痛 剂 | アセトアミノフェン 300mg | 「かぜ」による悪寒、発熱、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛みをしめます。 |
| 抗ヒスタミン剤 | クロルフェニラミン マレイン酸塩 2.5mg | 「かぜ」のひきはじめにみられる、くしゃみ、鼻水、鼻づまりのアレルギー症状に効果をあらわします。 |
| 鎮 咳 剤 | デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物 15mg | 鎮咳作用が強く、繁用されている非麻薬性咳止め薬で、咳中枢に働くことで「せき」をしめます。 |
| 気 管 支 拡 張 剤 | dL-メチルエフェドリン 塩酸塩 10mg | 気管支を拡げ、せきをしめてのどを楽にします。 |
| 去 痰 剤 | グアヤコール スルホン酸カリウム 80mg | 消毒作用のある去痰剤で、気道分泌を促進し、「たん」をうすめ、はき出しやすくなります。 |
| カ フ ェ イ ン 剤 | 無 水 カ フ ェ イ ン 50mg | 解熱鎮痛薬の鎮痛効果を増強します。 |

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレン glycole、香料を含有しています。

[効能・効果]

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

[用法・用量]

次の1回量を添付の計量カップにとり、1日3回食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。
場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用しても差し支えありません。

| 年 齢 | 1 回 量 |
|-------------|-------|
| 3才以上～7才未満 | 5.0mL |
| 1才以上～3才未満 | 3.7mL |
| 6ヶ月以上～1才未満 | 3.0mL |
| 3ヶ月以上～6ヶ月未満 | 2.5mL |

- (1) 本剤は劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 計量カップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

[包 装]

30mL(計量カップ添付)

■ 本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝日を除く）
9:00～17:00

製造販売元 **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地