

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。


# アリナミンメティカルゴールド

フルスルチアミン・ピリドキサールリン酸エステル水和物・メコバラミン製剤 葉酸配合

## 特 徴

第3類医薬品

- 吸収にすぐれたフルスルチアミン(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体)に加え、末梢神経修復に関与するメコバラミン(活性型ビタミンB<sub>12</sub>)、神経の機能維持に関与するピリドキサールリン酸エステル水和物(活性型ビタミンB<sub>6</sub>)を配合し、「目の奥の疲れ」「肩・首すじのこり」「重い腰の痛み」などのつらい症状にすぐれた効果をあらわします。
- 体のすみずみの血液循環に関与するコハク酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)を配合し、さらに葉酸、ガンマオリザノールを配合しています。
- 黄色の糖衣錠でのみやすく、1回1錠、1日3回で効果があります。



## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - 関係部位 症状
  - 皮膚 発疹・発赤、かゆみ
  - 消化器 吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、腹部膨満感、胃部不快感、腹痛
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
軟便、下痢、便秘
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能

次の諸症状の緩和

眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩・首すじのこり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」

## 用法・用量

次の量を、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1錠	3回
15歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関する注意>

用法・用量を厳守すること。

## 成 分 3錠(1日服用量)中

成 分	含 量
フルスルチアミン(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)として (フルスルチアミン塩酸塩)	100mg 109.16mg)
ピリドキサールリン酸エステル水和物	60mg
メコバラミン	1,500μg
コハク酸d-α-トコフェロール	100mg
ガンマオリザノール	10mg
葉酸	1mg


添加物：ケイ酸Ca、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、エリスリトール、ビタミンB<sub>2</sub>、酸化チタン、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、白糖

<成分に関する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります、葉酸によるものなので心配ありません。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓し、箱に入れて保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすぐのこと(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものとなる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5)服用のつどビンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (8)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。

アリナミン製薬株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087

受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

なお、健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

健康サイト

検索

<https://alinamin-kenko.jp>



製造販売元 アリナミン製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号