2023年6月改訂(第8版) 2022年4月改訂(第7版) 動物用医薬品

承認指令書番号 27動薬第3360号 販 売 開 始 2014年1月

貯法 室温保存

動物用点眼・清拭剤



®:登録商標

【成分及び分量】

成分・含量(1mL中) 日本薬局方 ホウ酸 20mg

添加物:ヒプロメロース、精製ヒアルロン酸ナトリウム、クロルヘキシジングルコン酸塩、

水酸化ナトリウム

【効能又は効果】

点眼:結膜炎、角膜炎、結膜充血、涙腺炎、眼瞼炎、外傷性眼炎

清拭:眼下毛の汚れの清拭

【用法及び用量】

点眼:1日3~6回、1回1~3滴の範囲で点眼する。

清拭:1日1~2回数滴を眼下毛に滴下し汚れを拭き取り、又は綿棒に滴下し眼下毛に

塗布し、汚れを清拭する。

【使用上の注意】

[基本的事項]

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- (1)本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (2)本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (3)本剤は獣医師の適正な指導の下で使用すること。

(使用者に対する注意)

本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人は 使用しないこと。

(動物に関する注意)

- (1)点眼用又は清拭用にのみ使用すること。
- (2)クロルヘキシジンを含有する人用医薬品では、アナフィラキシーの副作用が報告されている。そのため、動物が舐めたり、吸い込んだりするとそれらの症状を引き起こす可能性があるので、注意すること。

(取扱い上の注意)

- (1)小児の手の届かないところに保管すること。
- (2)本剤は高温を避け室温で保存すること。
- (3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4)本剤は外箱に表示の使用期限内に使用すること。
- (5)外箱に表示の使用期限内であっても、開栓後は速やかに使用すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

(1)誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。また、点眼又



は清拭の際に液が目に入った場合や皮膚についた場合は、直ちに水で洗うこと。

(2)皮膚が敏感な人、薬によりアレルギー症状を起こしたことのある人は手袋等を 着用して使用すること。本剤を素手で取り扱った場合、使用後によく手を洗う こと。

(動物に関する注意)

- (1)副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- (2)目やにや雑菌が容器の先端を介して混入し、薬液を汚染又は混濁させることがあるため、点眼又は清拭(眼下毛への滴下)の際に容器の先端が直接目や眼下毛等に触れないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3)清拭の際には清潔な綿棒やガーゼ等を使用し、目の周りは強く拭かないこと。

[専門的事項]

副作用

副作用が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

【薬理学的情報等】

[製剤に関する理化学的知見]

解剤

本剤は、無色澄明の液である。

 $pH:6.5\sim7.5$

浸透圧比:約1.1(生理食塩液に対する比)

【包装】

 $15mL \times 1$

【製品情報お問い合わせ先】

干寿製薬株式会社 カスタマーサポート室 〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号 TEL 0120-069-618 FAX 06-6201-0577 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

容器の使用方法



使用する時は、白色の大キャップ*はそのままにして、 青緑色の小キャップのみをはずし、容器の先端が目や 眼下毛等に触れないように注意して滴下する。

※大キャップは構造上はずれるようになっていますが、 使用に際しては、絶対にはずさないでください。誤って白色の大キャップをはずしますと、液がこぼれる場合があります。

製造販売元 干 寿 製 薬 株 式 会 社 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

販売 物産アニマルヘルス株式会社 大阪市中央区本町2-5-7

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所

(https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html) にも報告をお願いします。