


成分・分量 本品100mL

中、アラントイン0.2g、クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩0.2g、ベンザルコニウ
ム塩化物0.1g、添加物：無水クエン酸、クエン
酸ナトリウム水和物

使用上の注意 **相談すること** 1. 次の人は使用前
に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)
医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレル
ギー症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人
(4)深い傷やひどいやけどの人 2. 使用後、次の症状が
あらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使
用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること。皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3.
5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中
止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談すること。

保管及び取扱い上の注意(1)直射日光の当
たらぬ涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用
の原因になったり品質が変わる)(4)使用期
限を過ぎた製品は使用しないこと。



お客様相談窓口
TEL 0120-920-598
受付時間 9時～17時
(土・日・祝日を除く)

日本製

副作用被害救済制度
TEL 0120-149-931

製造番号及び使用
期限は容器底面に
記載

本品は透明フィル
ムで包装しており
ます。

昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12



U2104

色がつかない

第3類医薬品

傷口の 殺菌・消毒 ナクロカインS

外用 80mL

殺菌消毒薬

本剤の使用前に、この説明文をよくお読みください

効能・効果 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、
創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒
用法・用量 1日数回患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿
に浸して塗布する。**用法・用量に関連する注意** (1) 定
められた用法・用量を厳守すること。(2) 小児に使用さ
せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させる
こと。(3) 目に入らないように注意すること。万一、目
に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
(4) 外用にのみ使用すること。

U2104