

動物用医薬品

犬猫用止瀉薬

ペットの下痢止

ペットの下痢止は、犬・猫の下痢における症状の改善に効果があります。

【成分及び分量】

品名	ペットの下痢止	
有効成分 及び含量	本剤100g中	
	タンニン酸ペルベリン	3.0g
	天然ケイ酸アルミニウム	91.5g

添加物として、カルメロースカルシウム、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

【効能又は効果】

犬、猫の下痢における症状の改善

【用法及び用量】

犬：下記体重に対して1回の服用量を定め、1日1～3回症状に応じて経口投与する。

体重 20kg以上 2.0g

体重 5～20kg 1.0g

体重 5kg以下 0.5g

猫：下記体重に対して1回の服用量を定め、1日1～3回症状に応じて経口投与する。

体重 3kg以上 1.0g

体重 1～3kg 0.5g

体重 1kg以下 0.25g

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用してください。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
- 使用前に添付文書等をよく読み、十分理解した上で使用してください。

(犬及び猫に関する注意)

- 寄生虫に起因する下痢の場合は、本剤を投与して下痢がおさまってから寄生虫の駆除を行ってください。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 内容に異常を認めたものは使用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

- 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用済みの容器は地方公共団体条例などに従い処分してください。

2.使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 誤って本剤を大量に飲み込んだ場合は医師の診察を受けてください。

(犬及び猫に関する注意)

- 脱水症状を起こさないよう、湯冷ましやミネラル飲料などを少しずつ飲ませてください。
- 使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、獣医師にご相談してください。
- 本剤の投与により、まれに便秘がみられることがあります。

【薬理学的情報等】

(薬効薬理)

成分	作用
タンニン酸ベルペリン	腸内でタンニン酸とベルペリンに分解され、収れん防腐作用及び腸内での殺菌作用を示します。
天然ケイ酸アルミニウム	胃及び腸内において異常をきたす有害物質、過剰の水分または粘液などの吸着除去作用があります。

【製品情報お問い合わせ先】

現代製薬株式会社 お客様相談窓口

☎042-556-2528 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

製造販売元 **現代製薬株式会社**

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原8-4

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。