

動物用医薬品

貯法 密栓し、光、室温保存

クリンフ
ゴールド果貝米立

2020年12月作成（第1版）

ニトロフラザンとスルファメラジンナトリウムを配合した觀賞魚用の細菌性感染用治療薬です。すばやく水に溶けて觀賞魚の細菌性感染（腐ぐされ病・度フ染など）にすぐれた効果をあらわします。

【効能又は効果】

觀賞魚の細菌性感染症の治療

【成分及び分量】 本剤 10.5g 中

・ニトロフラザン：5.0g ・スルファメラジンナトリウム：5.0g ・結合剤 マクロゴール 6000：適量

【用法及び用量】

水 32 ～ 40L あたり本剤 1g（ニトロフラザンとして約0.48g）を徐々に加えた後、よく混和して薬浴する。

【水槽における本剤の使用例】

水槽の奥行×高さ (mm)	水 量	投 薬 量	2g 包装品	5g 包装品
450×240×300	30L	1.0g	1/2 包	1/5 包
600×300×300	60L	2.0g	1 包	2/5 包
750×400×450	120L	4.0g	2 包	4/5 包
900×450×450	160L	5.0g	2 1/2 包	1 包

薬浴期間は 5 ～ 7 日を目安とし、改善が見られない場合は飼育水を 1/2 ～ 1/3 取り替え再投薬して下さい。

【使用上の注意】

（基本的事項）

1. 守らなければならないこと

＜一般的注意＞

・本剤は觀賞魚の細菌性感染症を治療するために使用し、觀賞魚以外の魚又は動物には使用しないこと。なお、觀賞魚であつても、古代魚（アロワナ等）、大型マズメ類には使用しないこと。

・本剤は、適切な量で使用しないと期待される治療効果が得られず、これを超えて使用した場合には、思わぬ副作用が発生するおそれがあることから、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。

・本剤の使用に当たっては、適切な治療に必要な最小限の期間の投与に止めることとし、過剰にわたる連続投与は行わないこと。

・本剤は海水には使用しないこと。

・本剤は使用基準の定めるところにより使用すること。

＜取扱い及び廃棄のための注意＞

・本剤は小児の手が届かないところに保管すること。

・本剤は直射日光、高温多湿を避け、室温にて保管すること。

・本剤は食品と区別して保管すること。

・開栓後は速やかに使用すること。

・使用した薬液はくり返し使わないこと。

・使用後の薬液は、日光の下に 1 日放置してから廃棄すること。

・本剤使用後の薬剤ならびに使い残りの薬剤は、直接、河川・湖沼・海域等に流さないこと。また、使用済みの容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。

・水槽、浴槽等は薬液に浸さないようにすること。

・ろ材に活性炭、ゼオライト等を使用している場合は、取り除き使用すること。

・他の薬品および水質安定剤との併用は避けること。

2. 使用に際して気をつけること

＜使用者に対する注意＞

・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

・使用者はその取扱いに際してマスク、メガネ、手袋等を用いて、吸入及び目や皮膚に付着しないよう注意し、慎重に使用すること。

・使用した後、あるいは使用者の皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗い、水で十分うがいをする。

＜取扱い上の注意＞

・使用に際しての不明な点や事故等があった場合は、発売元へ連絡すること。

【貯蔵方法】

密栓し、光して貯蔵

※ご使用の際は添付文書を読んでいただき、よく理解した上で本剤をご使用ください。

製造者、販売者等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、発売元の【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/mal/iyakutou/tokuso/syo/housa/index.html>) にも報告をお願いします。

発 売 元（製品情報お問い合わせ先）

製造販売元



日本動物薬品株式会社
東京都葛飾区西新小岩4-37-9



アプトケン製薬株式会社
岐阜県岐阜市山崎久保字崎平1788番地-1

