

動物用医薬品

貯法 室温保存

承認指令書番号 14生畜第7195号

アグテン®

2021年4月作成（第1版）

【成分及び分量】100mL 中
・マラカイトグリーンシキウ酸塩：50mg ・精製水：適量

【効能又は効果】
觀賞魚の白点病、尾ぐされ症状、水カビ病の治療

【用法及び用量】
飼育水 100 リットルに対して本品 10mL を添加する。

【水槽における本剤の使用例】

幅×奥行×高さ(mm)	水 量	投与量
450×240×300	30L	3mL
600×300×360	60L	6mL
750×400×450	120L	12mL
900×450×450	160L	16mL

【使用上の注意】

【一般的注意】

(1) 本剤は、觀賞魚の白点病、尾ぐされ症状、水カビ病の治療をするために使用し、觀賞魚以外の魚又は動物には使用しないこと。

なお、觀賞魚であっても古代魚（アロワナ等）、大型ナマズ類や海水魚には使用しないこと。

(2) 本剤は、適切な量で使用しないと期待される治療効果が得られず、これを超えて使用した場合には、思わぬ副作用が発生するおそれがあることから、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。

【使用法に対する注意】

(1) 誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

(2) 本剤が眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。

(3) 直接皮膚などに付着しないよう注意すること。皮膚に付着した場合は、直ちに水及び石けん水等でよく洗うこと。

【魚に対する注意】

1. 制限事項

(1) 本剤は、觀賞魚以外に使用しないこと。

(2) 本剤は、海水魚には使用しないこと。

(3) 本剤は、古代魚（アロワナ等）や大型ナマズ類には使用しないこと。

2. 相互作用

(1) 他の薬品および水質安定剤との併用は避けること。

【取扱い上の注意】

(1) 使用時には、薬剤が飛び散らぬよう注意すること。

(2) 衣服やカーペット等が付着すると濃緑色の色素が落ちないので注意すること。

(3) 水槽内のシリコン部分やエアチューブ、濾器類、加熱品、砂利およびガラス面等が着色されることがある。

(4) 治療は、飼育水を取り替えずともよい。但し水槽に填えた水草に使用する場合は、治療後、飼育水を 1/2 以上取り替えること。

(5) 本剤使用後の薬剤ならびに使い残りの薬剤は、道路、河川・湖沼・海域等に流さないこと。

また、使用済みの容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。

(6) 植えたばかりの水草及び魚系の水草に使用しないこと。

(7) 本剤は、UV（紫外線）殺菌装置を装備した水槽に使用しないこと。

(8) ろ材に活性炭、ゼオライト等を使用している場合は、とり除き使用すること。

【保管上の注意】

(1) 本剤は、小児の手の届かないところに保管すること。

(2) 本剤は、直射日光、高温及び多湿を避け、室温にて保管すること。

(3) 誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れ替えないこと。

【その他の注意】

(1) マラカイトグリーンは実験動物において、発癌性や遺伝毒性が否定できないという評価がある。

※ご使用の際は添付文書を読んでいただき、よく理解した上で本剤をご使用ください。

製造者、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、発売元の【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/val/iyakutou/tokusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

発 売 元（製品情報お問い合わせ先）

 **日本動物薬品株式会社**
東京都葛飾区西新小岩4-37-9

製造販売元

 **アグアトゲン 株式会社**
徳島県美波町山田町久保原字梅子1700番地1

