

第3類医薬品


【販売名】コフジスACうがい薬

ご使用方法

ボトルを適度に傾け、真ん中あたりを軽く押し、添付の計量コップで本品約0.4mLをはかり取り、水ですめて約100mL(計量コップを水平にもどして目盛100)にし、ていねいうがいしてください。

①コップを斜めにし、0.4mLの線まで液を入れてください。

②コップを水平に戻して100目盛りまで水を入れてください。



③少量ずつ数度に分けてうがいでください。一度に多く口に含んだり、勢いよくうがいすると泡立ちが多くなります。本剤の成分CPCによるもので品質上問題はありません。

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **福地製薬株式会社**
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

お客様相談窓口 0748-52-2323
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

のどのはれ 殺菌消毒に

うがい薬

W

処方

抗炎症成分
水溶性
アズレン

殺菌成分
CPC

使いやすい
計量
コップ付き!



コフジスAC うがい薬

約250回分

第3類医薬品 100mL

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 口内にひどいただれのある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----|
| □ | 刺激感 |
- 3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

口腔・咽喉のはれ、口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】

1回、本品約0.4mLをはかり取り、水又は微温水(ぬるま湯)約100mLにうすめて、1日数回うがいでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。(必ずうすめて使用してください。)
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- うがい用のみ使用し、内服しないでください。
- 本剤は使用するときはみょうすめ、うすめた液は早めに使用してください。

【成分・分量】100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物……………0.5g
 セチルピリジニウム塩化物水和物……………1.25g
 添加物として、トメントール、プロピレングリコール、エタノール、無水リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ハッカ油を含有します。

【保管及び取扱上の注意】

- ご使用に際しては、この説明事項をよくお読みください。
- 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して立てて保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 火気に近づけないでください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。