

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

爪まわり などの ガチガチ荒れ治療薬

チュメキュア

販売名：チュメキュア

第3類医薬品 皮ふ軟化薬

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ) 部位
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれている所
- (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れている所)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (4) 外用にのみ使用すること
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないこと

成分・分量 100g中

尿素 20.0g トコフェロール酢酸エステル 2.0g グリチルリチン酸一アンモニウム 0.5g
添加物として、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンアラキルエーテル、ステアリルアルコール、グリセリン、プロピレングリコール、流動パラフィン、ワセリン、ベヘニルアルコール、サラシミツロウ、ステアリン酸、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、サリチル酸、ジメチルポリシロキサン、リン酸水素2Na、リン酸二水素Na、キサンタンガム、パラベン、エデト酸Na、2,2',2''-ニトリロトリエタノールを含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること
- (4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3