

ゼノール
ジクロダイレクト

手軽に患部へ
ぬりこめる

ゼノール
ジクロダイレクト

ハードゲル

肩・腰の
つらい
痛みは

手軽に患部へ
ぬりこめる

ゼノール
ジクロダイレクト

ジクロフェナクNa
1.0%配合

外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

ゼノール
ジクロダイレクト

手軽に患部へ
ぬりこめる

ゼノール
ジクロダイレクト

ハードゲル

肩・腰の
つらい
痛みは

手軽に患部へ
ぬりこめる

ゼノール
ジクロダイレクト

ジクロフェナクNa
1.0%配合

外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

ゼノール
ジクロダイレクト

手軽に患部へ
ぬりこめる

ゼノール
ジクロダイレクト

ハードゲル

肩・腰の
つらい
痛みは

手軽に患部へ
ぬりこめる

ゼノール
ジクロダイレクト

ジクロフェナクNa
1.0%配合

外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

開封口

つらい痛みを直接浸透して効く!
ジクロフェナクナトリウム配合

筋肉

痛み

下をまわすと(薬剤)が出てきます。
4~5mm出して使用してください。

チェック剤だからいろいろな患部に
手を汚さず、ぬりこめます

目の痛み 肩の痛み 腰の痛み

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、
外気にふれないようにしてください。(3)次剤に近づけないでくだ
さい。また、使用後は缶中に残っていないでください。(4)手の手の
届かない所に保管してください。(5)塗料(薬液、塗料、アセタ
ン、シリコーン、化繊、紙、皮革等に付着すると変質することがあります
ので、ご注意ください。(6)他の容器に入れないでください。
(7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内で
あっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

大野薬品工業株式会社
〒200-8501 東京都千代田区千代田1-27-1
TEL: 03-4507-555
http://www.taiho.co.jp/

三笠製薬株式会社
〒200-8501 東京都千代田区千代田1-27-1
TEL: 03-4507-555

に使用して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。また、必要なと
きに読めるように大切に保管してください。

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎
(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘な
ど)、筋肉痛、腰痛、打撲、挫傷(火傷、
凍傷)

用法・用量

1日3~4回適量を患部にすり込んでください。
ただし、患部をラップフィルム等の透気性の
悪いもので覆わないでください。なお、本成分を
含む他の外用剤も併用しないでください。

(用法・用量に留意する注意)

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)
本剤は、痛みや腫れ等の原因となっている病気を
治療するのではなく、痛みや腫れ等の症状のみを
治療する薬剤ですので、症状がある場合と併用
してください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服
しないでください。(4)1週間あたり50gを超えて使
用しないでください。(5)目に入らないよう注意す
てください。万一、目に入った場合には、すぐに水又は
ぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合に
は、眼科医の診察を受けてください。(6)使用部位
に他の外用剤を使用しないでください。(7)通気
性の悪いもの(ラップフィルム、透明ベニール等)で患
部を覆い、密封状態にしないでください。(8)患
部の汗をふきとってから使用してください。(9)患部
が直接患部に当たらないように、容器の中身の量
を4~5mm出してから使用してください。(10)患
部皮膚の受け皿が見え、患部の上面が露出するよう
になったら、本剤の使用をやめてください。また、受
け皿に残った薬剤は擦り取って使用しないでください。

成分	含量
ジクロフェナクナトリウム	1.0g
トリエタノール	3.0g

添加物として、ステアリン酸Na、パルミチン酸、
1,3-ブチレンジオキサン、イソプロパノール、その他
成分を含む。

42g

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

登録商標
01H402

使用上の注意

⊗ **してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状
を起こしたことがある人 (2) ゼノールを起した
ことがある人 (3) 経緯又は経緯していると思わ
れる人 (4) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 皮膚の深い部位(傷、
腫、おたけの下等) (3) 皮膚、粘膜、傷口(みずけ
した)等又は化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛
消炎剤を使用しないでください。

4. 長期使用しないでください。

併用すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりア
レルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の薬
品の併用を受けている人。ニューキノロン系抗菌薬

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに使用を中止
し、この説明書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。

併用薬名	症 状
皮膚・受容、かゆみ、ふれ、しれ、腫れ、刺激 感、熱感、皮膚の赤み、発疹、かゆみ、腫れ、 アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性 結膜炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎	皮膚・受容、かゆみ、ふれ、しれ、腫れ、刺激 感、熱感、皮膚の赤み、発疹、かゆみ、腫れ、 アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性 結膜炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎

また、下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

併用薬名	症 状
ショック アナフィラキシー ラバー	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、しれ、腫れ、 熱感、熱感、皮膚の赤み、発疹、かゆみ、腫れ、 アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性 結膜炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎

皮膚・受容、かゆみ、ふれ、しれ、腫れ、刺激
感、熱感、皮膚の赤み、発疹、かゆみ、腫れ、
アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性
結膜炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎

3. 5~6日間使用しても、症状がよくならない場
合は使用を中止し、この説明書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください。

引火性固体・引火性液体

製造番号
使用期限



4 987117 372601

紙 箱 3 袋 : PE, PET, 金属