

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

精選生薬循環器用薬（五疳強心薬） 和漢煉成 救心[®]



第2類医薬品

じうきや息切れは、循環器系や呼吸器系の働きの低下をはじめ、過度の緊張やストレス、更年期や暑さ・寒さなどによる自律神経の乱れ、過労や睡眠不足、タバコやアルコールのみ過ぎ、肥満、激しい運動など、さまざまな原因で現れます。

また、加齢などによって身体の諸機能が低下していくと、じうきや息切れも起こりやすくなります。さらに、こうした症状を放置しておくと、やがてまた病気の要因となり、しだいに生活の質の低下を引き起します。

救心は九種の動植物生薬がそれぞれの特長を發揮し、血液循環を改善していくの様々なじうきや息切れにすぐれた効きめを現します。

身体がだるくて気力が出ないと、暑さなどで頭がボーッとして意識が低下したり、めまいや立ちくらみがしたときの気づけにも救心は効果を發揮します。

⚠ 使用上の注意

× してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる〕
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の強心薬

相談すること

一、次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(一) 医師の治療を受けている人
(二) 妊婦または妊娠していると思われる人

二、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

三、五六日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

【効能】じうき、息切れ、気つけ

● こんなときの
じうき・息切れに



● こんなときの
じうきの気づけに

裏面にひらく

【用法 · 用量】

朝夕および就寝前に水またはお湯で服用する」と記載されています。

十五才未満　服用しないこと
口の中や舌下にじごめたり、かんだりしなじこと
(じ)のよつなのみ方をすると、成分の性質上、舌や口の中にしづれ感

年齢	一回量	服用回数
大人（十五才以上）	二粒	一回三回
十五才未満	服用しないこと	

【成分】六粒中に次の成分を含みます。

人	牛	蟾	成
鹿	酥		分
茸	五		分
末	二		量
参	mg	mg	
二十五	mg		
mg			
強壮作用により気力を高めます。	末梢循環を改善し、心臓の働きを助けてます。	心筋の収縮力を高めて血液循環をよくし、余分な水分を排泄して心臓の働きを助けます。また、呼吸機能を高めて全身の酸素不足を改善します。	主な作用

鎮静作用によりストレスなどからくる神経の緊張を和らげます。

動物胆	龍胆	脳
ハ mg	二 七 略	二 七 略

気力や意識の減退を回復させます。

消化器の働きをよくし、他の成分の吸収を助けます。

★救心はすぐれた効果を発揮できるように配合が考えられております。
★救心は服用しやすい小さな丸剤で、崩壊性にすぐれ、薬効成分がすみや
かに吸収されるよう工夫されております。

【保管および取扱い上の注意】

二四〇

(三) 他の容器に入れ替えること（誤用の原因になつたり品質が変わること）

四 作用期附子道地考

過度な飲食や肥満、喫煙習慣、急激な温度変化や夜ふかしは、心臓に負担をかけ、どうきや息切れの原因となります。

●過度な飲食や肥満



A cartoon illustration of a person with dark hair, wearing a grey t-shirt, smoking a cigarette. A plume of smoke is rising from the cigarette. To the left of the person, there is a red circle and the Japanese text '喫煙習慣' (smoking habit) written vertically.



救心製薬株式会社

電話 〇三一五三八五一一一(代表)

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または左記にお願いいたします。

〔受付時間〕 九時～十一時、十三時～十七時(土、日、祝日、弊社

（休業日を除く）