

押して開ける

1.0g×45包(15日分)

第2類医薬品

販売名：葛根湯エキス顆粒クラシエ

成分 成人1日の服用量3包(1包1.0g)中
葛根湯エキス(1/2量)…2,600mg

〔カッコン4g、マオウ・タイソウ各2g、ケイヒ・シャクヤク各1.5g、カンゾウ1g、
ショウキョウ0.5gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシ
プロピレングリコールを含有する。

(成分に関連する注意)

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることが
あります。

効能

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、
鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

製造
番号

使用
期限



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の
虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸の弱い人 (5)発汗傾向の
著しい人 (6)高齢者 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたこ
とがある人 (8)次の症状のある人 むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力 感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色 尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあら われる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状が
よくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

用法・用量 1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人(15才以上)…………… 1回 1包 15才未満7才以上 …………… 1回 2/3 包
7才未満4才以上 …………… 1回 1/2 包 4才未満2才以上 …………… 1回 1/3 包
2才未満 …………… 1回 1/4 包

(用法・用量に関連する注意)

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない
場合にはのみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた
場合には服用しないでください。

発 売 元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

副作用被害救済制度の間合せ先
☎0120-149-931 04300