

【販売名】オリール浣腸30

【成分】(本品30g中)

日局 濃グリセリン……………43(W/W)%
添加物として塩化ベンザルコニウムを含有します。

【効能・効果】

便秘

【用法・用量】

12才以上1回1個(30g)を直腸内に注入します。それで効果の
みられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果が
みられないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 浣腸にのみ使用すること。

【使用上の注意】

してはいけないこと

連用しないこと(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が
生じ)薬剤にたよりがちになる。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(流産の危険性
があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 2～3回使用しても排便がない場合

その他の注意

たちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがある。

第2類医薬品

【便秘しがちな方のために】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をき
めて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意を
もよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
- 繊維質の多い食物と水分を多くとるよう心がけましょう。
(例:野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻等)
- 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけましょう。
- 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよお
しやすくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【使用法】

- (1) 容器先端のキャップを取りはずし、肛門部になるべく深く
挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し
出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
 - (2) 容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
 - (3) 薬液注入後、十分便意が強まってから排便してください。
- 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので
注意してください。
 - 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ体温近くまで温めると快適
に使用出来ます。

製造番号

使用期限

発売元

PI株式会社プロダクト・イノベーション

富山県富山市浜黒崎239番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

池尻製薬株式会社

奈良県高市郡高取町大字下子島386番地

お客様相談室 ☎0744-52-2055
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)