

## 第2類医薬品

この外箱は、服用の際にはよく読み、大切に保管してください。

胃腸薬

# キャベジン<sup>®</sup>コーワ<sup>®</sup>αプラス顆粒

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬

2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

#### ■ 相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)高齢者。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)次の症状のある人。 排尿困難

(6)次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき

4.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

#### ■ 効能・効果

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重

## ■用法・用量

下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1包	1日3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
8歳未満の小児	×服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■成分・分量(3包:3.9g中)

メチルメチオニンスルホニウムクロリド 150.0mg、炭酸水素ナトリウム 600.0mg、水酸化マグネシウム 210.0mg、沈降炭酸カルシウム 1340.0mg、ロートエキス3倍散 90.0mg (ロートエキスとして30.0mg)、ソヨウ乾燥エキス 20.0mg (ソヨウとして180.0mg)、コウボク乾燥エキス 15.0mg (コウボクとして180.0mg)、センブリ末 30.0mg、ビオチン2000 24.0mg、リパーゼAP12 15.0mg

[添加物]ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、トウモロコシデンプン、硬化油、D-マンニトール、乳酸Ca、スクラロース、*l*-メントール、二酸化ケイ素、香料、デキストリン

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(外箱及び分包に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

### 本製品に関するお問い合わせ

お問い合わせ先はお買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

- 本製品には添付文書はついておりません。  
外箱の記載事項と同様のものです。