

## 第2類医薬品 鎮痛消炎薬

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

使用開始日: 年 月 日

# ロキソブフェン<sup>®</sup> EX

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

##### 1. 次の人は使用しないでください

- 1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 3) 15歳未満の小児。

##### 2. 次の部位には使用しないでください

- 1) 目の周囲、粘膜等。
- 2) しみん、かぶれ、傷。
- 3) みずむしたむしり等または化膿している患部。

##### 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

##### 4. 連続して2週間以上使用しないでください

(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

#### 🗨 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- 1) 医師の診療を受けている人。
- 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- 4) 高齢者。
- 5) 次の診断を受けた人。 気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、ほれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、発あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
下痢・軟便

4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性あります)

### 効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 用法・用量

- 表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。
- 15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

- 1) 用法・用量を厳守してください。
- 2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- 3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。
- 4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- 5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かしてから使用してください。

成分・分量(膏体100g中) 1枚7cm×10cm、膏体量0.7g

ロキソブフェンナトリウム水和物……………8.1g(無水物として7.14g)  
0-メントール……………3.5g トコフェロール酢酸エステル……………2.3g  
グリチルチン酸……………0.19g  
添加物: ミリスチン酸イソプロピル、BHT、タルク、ステレン・イソブレン・ステレンプロポグコポリマー、テルペン樹脂、流動パラフィン、香料、その他1成分

### 保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手が届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

発売元

ラカール薬品販売株式会社

登録販売元

三友薬品株式会社

東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

#### <お問い合わせ先>

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ラカール薬品販売株式会社  
フリーダイヤル 0120-86-8998



副作用被害救済制度  
電話: 0120-149-931



4 987435 556318